

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A  
BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

## KÖRÜLMETÉLÉS (CIRCUMCISIO)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Beteg neve                     |  |
| Beteg TAJ száma                |  |
| Beteg születési helye és ideje |  |
| Tájékoztatást adó orvos neve   |  |
| A műtét tervezett időpontja    |  |
| Választott érzéstelenítés      | érezéstelenítő krém   érzéstelenítő injekció |

### **Tisztelt Páciensünk!**

*Az Ön jelen betegsége sebészi beavatkozást igényel. A beavatkozás, műtét elvégzéséhez szükségünk van az Ön beleegyezésére. E tájékoztató célja, hogy megismertessük Önt a betegségével, és annak kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Ezekre az ismeretekre azért van szükség, hogy megfontolt, felelős döntés alapján adhassa beleegyezését a tervezett beavatkozáshoz. Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat! Együttműködését köszönjük!*

### A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja

Az előzetes vizsgálatok Önnél fitymaszűkületet (Phimosis) mutattak ki. Ennek sebész kezelését körülmetélésnek (circumcisio) hívják, amelyet altatásban végzünk.

### A tervezett beavatkozás és gyógymód célja és a beavatkozástól várható előny

A műtétől várható előnyös változás a makk leszorításának (glans strangulatio) megszüntetése.

Ezzel együtt megoldódnak a kapcsolódó higiénés problémák is. A műtét hozzájárul a hímvesszőrák kialakulásának megelőzéséhez.

## A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye

A műtét elmaradása esetén a makk leszorítása (glans strangulatio) fennmarad, a makk vérellátása sérül, a makk leszorítása által okozott vérellátási zavar miatt a makk elhalhat.

A higiénés probléma fennmarad, a hímvesszőrák kialakulásának nagyobb a kockázata.

## A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődmények

- Műtét utáni vérzés előfordulás: 1 %,
- Műtét utáni fertőzés előfordulás: 1 %,
- Műtét utáni fájdalomérzet gyakorisága: 1-5%
- A fityma visszaszűkülésének kockázata: 1 % alatt
- Sebgyógyulási zavar előfordulásának kockázata: 1 % alatt
- Előfordulhat még kis gyakorisággal allergiás reakció az érzéstelenítőszere, elsősorban genetikai okokra visszavezethető sebgyógyulási zavar.

## Alternatívák ismertetése

Alternatív eljárás a Phimotomia (Schloffer műtét), amely rosszabb esztétikai eredményt nyújt.

## A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátörmlesztéssel.

Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást, és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásomat.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

---

orvos aláírása és pecsétje

---

beteg (törvényes képviselő) aláírása