


Rezūm™

Vízgőz-terápia

Tartós klinikai eredmények 5 éven át¹



A vizsgálati eredmények igazolják, hogy a Rezūm™ vízgőz-terápia biztonságos és hatékony, rendelőben elvégezhető BPH-kezelés, amely hatékonyan enyhíti a tüneteket, megőrzi a szexuális funkciókat, egészen 5 éven át.

Hosszú távú tartósság

A Rezūm-terápia konvektív energiát alkalmaz az elzáródást okozó prosztata-szövet eltávolítására, és kategóriájában a legjobb eredményt nyújtja, mindössze 4,4%-os sebészeti újrakezelési aránnyal 5 év alatt.

5 éves sebészeti újrakezelési arány

Rezūm rendszer

A Rezūm II pivotál vizsgálatban, amelyben férfiak vízgőz-terápiában részesültek

4.4%

UroLift™ Rendszer^{*2}

A LIFT pivotál vizsgálatban, amelyben férfiak PUL-terápiában részesültek

13.6%

TUMT^{*3-6}

akár 21%

TUNA^{*3-5}

akár 51%

*A különböző klinikai vizsgálatok eredményei nem hasonlíthatók össze közvetlenül. Az információ kizárólag oktatási célokat szolgál.

Tartós tünetenyhülés és életminőség-javulás

a kiindulási állapothoz képest

48%
IPSS

Nemzetközi Prostata
Tünetpontszám

44%
Qmax

Csúcs vizeletáramlási
sebesség

45%
IPSS-QOL

Életminőség-javulás

Sokoldalúan alkalmazható a középső lebeny elzáródásának (MLO) kezelésére



- A Rezūm-terápia képes kezelni az oldalsó és központi zónákat anélkül, hogy az orvosoknak speciális technikát kellene elsajátítaniuk.
- Más BPH minimálisan invazív sebészeti technikáktól (MIST) eltérően a Rezūm-terápiát az AUA is ajánlja az MLO kezelésére.⁷

Bizonyított biztonságossági profil és a szexuális funkciók megőrzése

- Nincs hőhatás a célzott kezelési zónán kívül
- Az 1–5. év között nem fordult elő késői, kezeléssel összefüggő mellékhatás
- A vizsgálat teljes időtartama alatt nem jelentkezett újonnan kialakult, eszközzel vagy beavatkozással összefüggő merevedési zavar



További információért a klinikai vizsgálatról vagy a Rezūm™ vízgőz-terápiáról látogasson el a következő weboldalra: <https://www.bostonscientific.com/Rezum5Year>

A Rezūm vízgőz-terápiával összefüggő lehetséges kockázatok közé tartozhat többek között a dysuria (fájdalmas vizezés), hematuria (vér a vizeletben), hematospermia (vér az ondóban), az ejakulátum mennyiségének csökkenése, feltételezett húgyúti fertőzés (UTI), gyakori vizelési inger, vizeletretenció vagy sürgető vizelési inger.

1. McVary KT, Gittelman MC, Goldberg KA és mtsai. A multicentrikus, randomizált, sham-kontrollált vizsgálat végső, 5 éves eredményei a Rezūm vízgőz-terápiáról a közepesen súlyos-súlyos alsó húgyúti tünetek kezelésére, amelyeket jóindulatú prosztata-megnagyobbodás okoz. J Urol. 2021. április 19. Online megjelenés nyomtatás előtt.
Roehrborn CG, Barkin J, Gange SN és mtsai. Az előremutató, randomizált, kontrollált prosztata urethralis L.I.F.T. vizsgálat 5 éves eredményei. Can J Urol. 2017. jún.;24(3):8802-13.
Zlotta AR, Giannakopoulos X, Maehlum O és mtsai. A prosztata transzuretrális tüablációjának (TUNA) hosszú távú értékelése a tünetes jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kezelésére: klinikai eredmények akár öt évig három központból. Eur Urol. 2003. júl.;44(1):89-93.
Rosario DJ, Phillips JT, Chapple CR. A prosztata transzuretrális tüablációjának tartóssága és költséghatékonysága a prosztata transzuretrális rezekciójának alternatívájaként, amikor az alfa-adrenerg antagonisták sikertelenek. J Urol. 2007. márc.;177(3):1047-51; megbeszélés 1051.
Hill B, Belville W, Bruskewitz R és mtsai. A prosztata transzuretrális tüablációja szemben a transzuretrális rezekcióval a tünetes jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kezelésében: egy előremutató, randomizált, multicentrikus klinikai vizsgálat 5 éves eredményei. J Urol. 2004. jún.;171(6 Pt 1):2336-40.
Miller PD, Kastner C, Ramsey EW és mtsai. Hűtött termoterápia a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kezelésére: a Targis rendszerrel elért eredmények tartóssága. Urology. 2003. jún.;61(6):1160-4. Parsons JK, Dahm P, Köhler TS és mtsai. Az alsó húgyúti tünetek sebészeti kezelése, amelyeket jóindulatú prosztata-megnagyobbodás okoz: AUA irányelv módosítás 2020. J Urol. 2020. okt.;204(4):799-804.
Kizárólag vényre.
FIGYELMEZTETÉS: A törvény előírja, hogy ezek az eszközök kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthetők. Az indikációk, kontraindikációk, figyelmeztetések és a használati utasítások az egyes eszközökhöz mellékelte termékdokumentációban találhatók. Az információk csak olyan országokban használhatók, ahol az egészségügyi hatóságok megfelelő engedélyt adtak ki. Ez az anyag nem használható Franciaországban.
A bemutatott termékek kizárólag TÁJÉKOZTATÁSI célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy egyes országokban nem engedélyezettek vagy nem kaphatók. Kérjük, érdeklődjön a helyi értékesítési képviselőnél vagy az ügyfélszolgálatnál az elérhetőségről.
Minden kép a Boston Scientific tulajdonát képezi. Minden védjegy a megfelelő tulajdonosát illeti.